



# Guía de la vacuna y dosis de refuerzo COVID-19 para proveedores y educadores

ACTUALIZADO 3/16/2022

## Certificado de vacunación

En poco tiempo será necesario presentar un comprobante de vacunación para entrar a los Estados Unidos por tierra con una visa H-2. Se aceptan las siguientes vacunas:

- Johnson & Johnson (1 dosis)
- Pfizer (2 dosis)
- Moderna (2 dosis)
- AstraZeneca (2 dosis)
- Covaxin (2 dosis)
- Covishield (2 dosis)
- Sinopharm (2 dosis)
- Sinovac (2 dosis)
- Novavax/Covovax (2 dosis)

Si el trabajador agrícola recibió otro tipo de vacuna, incluido Sputnik V o Cansino, es posible que deban vacunarse con otra vacuna antes de entrar a los Estados Unidos.

Puede comunicarse con Call for Health, por medio de WhatsApp, +1 737 414-5121, para encontrar proveedores cercanos en México que ofrecen las vacunas admitidas.

## Recomendaciones de las dosis de refuerzo

Consulte la siguiente tabla para averiguar si una persona debe recibir una dosis de refuerzo u otra vacuna COVID-19 según su historial de vacunación.

Se recomiendan las dosis de refuerzo para toda persona mayor de 12 años si han:

- Recibido la vacuna de Johnson & Johnson (J&J) por lo menos hace 2 meses ●
- Recibido las dos dosis de Moderna por lo menos hace 5 meses ●
- Recibido las dos dosis de Pfizer por lo menos hace 5 meses

Tomar en cuenta:

- Se considera que la persona está al día con sus vacunas si ha recibido la pauta inicial completa y una dosis de refuerzo. Esto incluye los refuerzos recibidos en México **si el refuerzo está aprobado por la FDA, autorizado por la FDA y aprobado por la OMS.**
- Si una persona recibió un refuerzo **no aprobado por la FDA o no aprobado por la OMS**, se puede administrar un refuerzo aprobado por la FDA después del período de tiempo indicado.
- Los pacientes pueden escoger la vacuna que prefieran (dependiendo de la disponibilidad) para la pauta inicial así como para su dosis de refuerzo. Se les debe ofrecer Pfizer y Moderna antes que Johnson & Johnson, en la mayoría de los casos.
- Las vacunas se pueden administrar hasta 4 días antes del tiempo recomendado.
- La dosis de refuerzo de Moderna es media dosis, mientras que la dosis de **Pfizer siempre es una dosis completa**, sin importar el tipo de vacuna que se recibió previamente.

HISTORIAL DE VACUNACIÓN	TIEMPO QUE DEBE ESPERAR	NECESITA/SE RECOMIENDA LA PRÓXIMA VACUNA
0 vacunas	Ninguna	1ª dosis Moderna (dosis completa) o Pfizer, citar para 2ª dosis
1 J&J	2 meses	Dosis de refuerzo Moderna (media dosis) o Pfizer
1 Moderna	28 días	2ª dosis Moderna (dosis completa)
2 Moderna	5 meses	Dosis de refuerzo Moderna (media dosis) o Pfizer
1 Pfizer	21 días	2ª dosis Pfizer
2 Pfizer	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna (media dosis)
1 AstraZeneca	28 días	2ª dosis Pfizer para terminar la pauta
2 AstraZeneca	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer
1 SinoPharm	28 días	2ª dosis Pfizer para terminar la pauta
2 SinoPharm	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer
1 Sinovac	28 días	2ª dosis Pfizer para terminar la pauta
2 Sinovac	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer
1 CanSino Bio	28 días	1ª dosis Moderna (dosis completa) o Pfizer, citar para 2ª dosis
2 CanSino Bio	28 días	1ª dosis Moderna (dosis completa) o Pfizer, citar para 2ª dosis
1 Sputnik V	28 días	1ª dosis Moderna (dosis completa) o Pfizer, citar para 2ª dosis
2 Sputnik V	28 días	1ª dosis Moderna (dosis completa) o Pfizer, citar para 2ª dosis
1 Covaxin	28 días	2ª dosis Pfizer para terminar la pauta
2 Covaxin	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer

Para personas que puedan haber comenzado la pauta de la vacuna de nuevo en los Estados Unidos, se recomienda una dosis de refuerzo después de completar la pauta completa. Ver el tiempo recomendado para las dosis de refuerzo.

## Guía para vacunas pediátricas

La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 está disponible para niños y niñas entre 5 y 11 años.

- **Dosis:** la vacuna Pfizer para menores contiene una dosis más pequeña (1/3 de dosis) que la vacuna para adultos, lo que significa que es posible que no esté disponible en todos los centros. Sin embargo, como todos los demás, los niños recibirán dos vacunas, separadas por tres semanas.
- **Efectos secundarios:** los efectos secundarios temporales al recibir la vacuna contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años han sido similares a los de las personas de 16 a 25 años. El niño/niña puede tener dolor en el brazo, dolor de cabeza, cansancio o estar dolorido alrededor de un día.

## Nombres de las vacunas

**Aprobadas por la OMS y aprobadas en México (desde el 7 de enero 2022)**

NOMBRE	OTRO(S) NOMBRE(S)	# DE DOSIS
Pfizer	BioNTech, Comirnaty	2
Moderna	Spikevax	2
Johnson & Johnson	Janssen	1
AstraZeneca	Vaxzevria, Covishield	2
Sinopharm	BBIBP-CorV, Covilo	2
Sinovac	Coronovac	2
Covaxin	BBV152, Bharat Biotech, Ocugen, Virovax	2

**No aprobadas por la OMS, pero aprobadas en México (desde el 7 de enero de 2022)**

NOMBRE	OTRO(S) NOMBRE(S)	# DE DOSIS
CanSino Biologic	Convidecea	1
Sputnik V	Gamaleya	2
Abdala	CIGB 66	3

Fuente: [www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker](http://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker)

## Vacunas COVID-19 admitidas

	VACUNAS APROBADAS O AUTORIZADAS POR LA FDA (ADMIN. DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE.UU.)	VACUNAS PARA USO EN EMERGENCIAS (EUL) POR LA OMS
Una dosis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Janssen/J&amp;J</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Janssen/J&amp;J</li> </ul>
Pauta de 2-dosis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pfizer-BioNTech</li> <li>• Moderna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pfizer-BioNTech</li> <li>• Moderna</li> <li>• AstraZeneca</li> <li>• Covaxin</li> <li>• Covishield</li> <li>• BIBP/Sinopharm</li> <li>• Sinovac</li> </ul>

Fuente: [www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel/technical-Instructions.html](http://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel/technical-Instructions.html)

