



Guía de la vacuna y dosis de refuerzo COVID-19 para proveedores y educadores

ACTUALIZADO 8/25/2022

Certificado de vacunación

Es necesario presentar un comprobante de vacunación para entrar a los Estados Unidos por tierra con una visa H-2. Se aceptan las siguientes vacunas:

- Johnson & Johnson (1 dosis)
- Pfizer (2 dosis)
- Moderna (2 dosis)
- AstraZeneca (2 dosis)
- CanSino (1 dosis)
- Covaxin (2 dosis)
- Covishield (2 dosis)
- Sinopharm (2 dosis)
- Sinovac (2 dosis)
- Novavax/Covovax (2 dosis) –no aprobado en México

Si el trabajador agrícola recibió otro tipo de vacuna, incluido Sputnik V o Abdala, es posible que deban vacunarse con otra vacuna antes de entrar a los Estados Unidos. Puede comunicarse con Call for Health, por medio de WhatsApp, +1 737 414-5121, para encontrar proveedores cercanos en México que ofrecen las vacunas admitidas.

Consulte la siguiente tabla para informarse sobre las recomendaciones para las dosis de refuerzo (boosters) o para decidir cuál debe ser la siguiente dosis de la vacuna COVID-19 según el historial de vacunación. Esta información se aplica a personas mayores de 18 años. Para asesoramiento adicional, por favor consultar [Vacunas COVID-19 para personas vacunadas fuera de los Estados Unidos](#).

Se reúne los requisitos para la **primera dosis de refuerzo** si*:

- Recibió la vacuna de Johnson & Johnson por lo menos hace 2 meses O
- Recibió las dos dosis de la vacuna de COVID-19 de Moderna por lo menos hace 5 meses O
- Recibió las dos dosis de la vacuna de COVID-19 de Pfizer por lo menos hace 5 meses O
- Terminó una de las pautas aprobadas por la FDA o la WHO (OMS) por lo menos hace 5 meses

*Los intervalos varían para los [individuos inmunocomprometidos](#).

Se reúne los requisitos para una **dosis de refuerzo adicional** si:

- Recibió dos dosis de la vacuna de Johnson & Johnson por lo menos hace 4 meses (18+)
- Es mayor de 50 años y recibió la vacuna por lo menos hace 4 meses
- Tienen 12 años y tienen condiciones inmunocomprometidas

HISTORIAL DE VACUNACIÓN	TIEMPO DE ESPERA	PRÓXIMA VACUNA QUE SE RECOMIENDA
VACUNAS AUTORIZADAS PARA USO DE EMERGENCIA O APROBADAS POR LA FDA		
0 vacunas	Ninguno	1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para 2ª dosis
1 J&J	2 meses	1ª dosis Moderna o Pfizer
1 Moderna	4-8 semanas	2ª dosis Moderna
2 Moderna	5 meses	Dosis de refuerzo Moderna o Pfizer
1 Pfizer	3-8 semanas	2ª dosis Pfizer
2 Pfizer	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna
1 Novavax	3-8 weeks	Dose #2 Novavax
2 Novavax	5 months	Booster dose Pfizer or Moderna
VACUNAS APROBADAS POR LA WHO/OMS		
1 AstraZeneca	8-12 semanas	2ª dosis Pfizer o Moderna para terminar la pauta
2 AstraZeneca	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna
1 CanSino	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna
1 Covaxin	28 días	2ª dosis Pfizer o Moderna para terminar la pauta
2 Covaxin	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna
1 Novavax/Covovax	28 días	2ª dosis Pfizer o Moderna para terminar la pauta
2 Novavax/Covovax	5 meses	2ª dosis Pfizer o Moderna para terminar la pauta
1 SinoPharm	28 días	2ª dosis Pfizer o Moderna para terminar la pauta
2 SinoPharm	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna
1 Sinovac	28 días	2ª dosis Pfizer o Moderna para terminar la pauta
2 Sinovac	5 meses	Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna
VACUNAS NO APROBADAS POR LA FDA NI LA WHO/OMS		
1 Abdala	28 días	1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para 2ª dosis
2 Abdala	28 días	1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para 2ª dosis
3 Abdala	28 días	1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para 2ª dosis
1 Sputnik V	28 días	1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para 2ª dosis
2 Sputnik V	28 días	1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para 2ª dosis

Navegar por las vacunas usadas en el extranjero

Actualmente hay muchas combinaciones de vacunas que se pueden usar para pacientes que se han vacunado en el exterior.

Combinaciones de vacunas comúnmente recibidas por esta población de pacientes:

PAUTA INICIAL	DOSIS DE REFUERZO #1	DOSIS DE REFUERZO #2
Johnson & Johnson	Astra Zeneca (WHO)	Pfizer o Moderna (solo mayores de 50). Por lo menos 4 meses desde la 1ª dosis de refuerzo.
Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Pfizer o Moderna (mayores de 18). Por lo menos 4 meses desde la 1ª dosis de refuerzo.
Johnson & Johnson	Sputnik V (No-WHO)	Pfizer o Moderna (mayores de 18) Por lo menos 28 días desde la última vacuna.
Pfizer, 2 dosis	Sinovac	Pfizer o Moderna (mayores de 50) Por lo menos 4 meses desde la 1ª dosis de refuerzo.
Sinopharm, 2 dosis	Pfizer (en EEUU)	Pfizer o Moderna (mayores de 50) Por lo menos 4 meses desde la 1ª dosis de refuerzo.
AstraZeneca	Sputnik V (No-WHO)	Pfizer o Moderna Por lo menos 28 días desde la última vacuna.
Sputnik V (No-WHO)	AstraZeneca	Pfizer o Moderna (dosis completa) para terminar la pauta. Por lo menos 28 días desde la última vacuna. El refuerzo se necesita 5 meses después.

Tomar en cuenta:

- Se recomienda la dosis de refuerzo inicial para toda persona mayor de 5 años de edad.
- Las vacunas ARNm (mRNA) son recomendadas para la pauta inicial y la dosis de refuerzo. J&J solo se debe ofrecer en ciertas situaciones y se debe evitar como dosis de refuerzo, si es posible.

Otros recursos:

- [Asesoramiento adicional sobre las vacunas pediátricas](#)
- [Sitio web de vacunas COVID-19 del DHHS de Carolina del Norte](#)
- [Sitio web de los CDC sobre las vacunas contra el COVID-19](#)
- [CDC COVID-19 Vaccination Schedules \(English\)](#)
- [Sitio web de la FDA sobre vacunas contra el COVID-19](#)

